

レジメン名：Isa-KD 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 =

【催吐性リスク】 最小

※ 1 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Day1: サークリサ投与終了後より カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴[化療] 30分かけて 20 mg/m ² 50 mL		+03:00	+00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg			00:00					
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Day8, 15: サークリサ投与終了後より カイプロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴[化療] 30分かけて 56 mg/m ² 50 mL		+03:00	+00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg			00:00					
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-7」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Day8, 15:サークリサ投与終了後より カイトロリス点滴静注 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 56 mg/m ² 50 mL	30分かけて	+03:00	+00:00					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg			00:00					
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 カロナール錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射										
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-7」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg			00:00					
注射										
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 カロナール錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

※2コース目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Day1, 15: サークリサ投与終了後より カイトロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 30分かけて 56 mg/m ² 50 mL		+02:00	+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg			00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Day1, 15: サークリサ投与終了後より カイトロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 30分かけて 56 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 10 mg/kg 250 mL		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Day1, 15: サークリサ投与終了後より カイトロリス点滴静注用 ブドウ糖注射液 5%50mL	点滴【化療】 30分かけて 56 mg/m ² 50 mL		+02:00	+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) サークリサ投与開始15-60分前に内服 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg			00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00	00:00					

【備考】

- ・ infusion reaction を来たす可能性があるため、投与速度に注意が必要。下記にはサークリサーの体重、投与回数、時間別の表を示す。

投与速度 (mL/h)

経過時間	体重					
	50kg 以下		51kg～70kg		71kg 超	
	初回	2回目	初回	2回目	初回	2回目
0分	88	88	63	63	49	49
60分	113	138	80	98	63	76
90分	138	188	98	134	76	104
120分	163		116	143	90	111
150分				134		104
180分						111