

## レジメン名：Atezolizumab + Bmab 療法

【適応癌腫】 肝細胞癌

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 最小

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント  | 1 回投与量 (補正単位) | 速度指示                                   | day(1) |  |  |  |  |  |
|-------|--|---------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| Rp 01 | 点滴注射<br>5分かけて<br>生理食塩液 50mL<br>ルート確保用                        |               | 点滴静注 (速度入力なし)<br>50 mL                 | +00:00 |  |  |  |  |  |
| Rp 02 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>【臨時】テセントリク点滴静注1200mg/20mL<br>生理食塩液 250mL | 1200          | 点滴【化療】<br>mg/Body<br>【冷&暗保存】<br>250 mL | +00:05 |  |  |  |  |  |
| Rp 03 | 点滴注射<br>5分かけて<br>生理食塩液 50mL<br>フラッシュ用                        |               | 点滴静注 (速度入力なし)<br>50 mL                 | +01:05 |  |  |  |  |  |
| Rp 04 | 点滴注射<br>フィルターなしのルートに交換<br>生理食塩液 50mL<br>ルート確保用               |               | 点滴静注 (速度入力なし)<br>5分かけて<br>50 mL        | +01:10 |  |  |  |  |  |
| Rp 05 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>全量：100mLとして<br>アバスチン点滴静注<br>生理食塩液 100mL  | 15            | 点滴【化療】<br>mg/kg<br>100 mL              | +01:15 |  |  |  |  |  |
| Rp 06 | 点滴注射<br>5分かけて<br>生理食塩液 50mL<br>フラッシュ用                        |               | 点滴静注 (速度入力なし)<br>50 mL                 | +02:45 |  |  |  |  |  |

### 【備考】

間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝障害、甲状腺機能障害、腎障害、副腎障害、血栓塞栓症などに注意が必要。また投与終了後に副作用が発現する可能性もある。

ペバシズマブによる血圧上昇、蛋白尿にも注意。

クール毎の投与速度

|            | 初回   | 2 回目 | 3 回目 |
|------------|------|------|------|
| テセントリク投与速度 | 60 分 | 30 分 | 30 分 |
| アバスチン投与速度  | 90 分 | 60 分 | 30 分 |