

レジメン名：mFOLFOX6 + NIVO 療法

【適応癌腫】 胃癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30分かけて 【臨時】オプジーボ点滴静注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 240 mg/Body 100 mL 【混注不適】 【冷所保存】		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 3.3mg/1mL グラネセトロン静注液シリンジ 3mg 「キリ」 生理食塩液 100mL	点滴静注（速度入力なし） 9.9 mg 3 mg 100 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 側管でレボホリナートと同時に オキサリプラチン点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 120分かけて 85 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 04	点滴注射 側管でオキサリプラチンと同時に レボホリナート点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴静注（速度入力なし） 120分かけて 200 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） オキサリプラチン、レボホリナート終 フルオウラシル注 生理食塩液 20mL	静注【化療】 400 mg/m ² 20 mL		+03:00						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 速度：5mL/hにて インフューザーポンプ使用 フルオウラシル注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 全量：230mLとして 46時間かけて 2400 mg/m ² 230 mL		+03:00						

【備考】

オキサリプラチンの累積投与量が 800~900mg/m²で末梢神経障害の出現率が増加

間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝障害、甲状腺機能障害、腎障害、副腎障害、血栓塞栓症などに注意が必要。また投与終了後に副作用が発現する可能性もある。