

レジメン名：IRIS 療法

【適応癌腫】 大腸癌/胃癌

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 9.9 mg 100 mL	212mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 90分かけて イリノテカン点静注 生理食塩液 500mL	点滴【化療】 125 mg/m ² 500 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1-4日分 エスワンタイホウ配合OD錠 体表面積により用量調節必要	※化学療法内服 day15から2週間休薬 120 mg/m ²	<1.25m ² : 80mg/day 1.25~1.5m ² : 100mg/day 1.5m ² > : 120mg/day	+00:00 +12:00	→					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1-4日分 エスワンタイホウ配合OD錠 体表面積により用量調節必要	※化学療法内服 day15から2週間休薬 120 mg/m ²								+00:00 +12:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 9.9 mg 100 mL	212mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 90分かけて イリノテカン点静注 生理食塩液 500mL	点滴【化療】 125 mg/m ² 500 mL		+00:30						

【備考】

UGT1A1*6*28 のホモ接合体、またはヘテロ接合体を有する場合は CPT-11 を 150mg/m² から 120mg/m² への減量を考慮。必要時に下痢予防として半夏瀉心湯 7.5g/3x を治療前日から考慮。

TS1 の減量基準：非血液毒性(grade2 以上)、CCr<60mL/min→1 段階減量

好中球数 1000/mm³、血小板 75000/mm³ 未満→1 段階減量