

レジメン名：ABVD 療法

【適応癌腫】 リンパ腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 8 コース

【催吐性リスク】 高度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	静脈内注射 グラニセトロン静注液シリンジ 3mg	3 mg	静注 「ナリ」	+00:00						
Rp 02	静脈内注射 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 20mL	6.6 mg 10 mL	静注	+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エクザール注射用 10mg 生理食塩液 20mL	6 mg/m ² 20 mL	静注 [化療]	+00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて ドキソルビシン注 生理食塩液 100mL	25 mg/m ² 100 mL	点滴 [化療]	+00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1時間かけて プレオ注射用 生理食塩液 100mL	10 mg/m ² 100 mL	点滴 [化療]	+00:30						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 150分かけて ダカルバジン注用 100 ブドウ糖注射液 5%500mL	375 mg/m ² 500 mL	点滴 [化療]	+01:30						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	静脈内注射 グラニセトロン静注液シリンジ 3mg	3 mg	静注 「ナリ」	+00:00						
Rp 02	静脈内注射 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 20mL	6.6 mg 10 mL	静注	+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エクザール注射用 10mg 生理食塩液 20mL	6 mg/m ² 20 mL	静注 [化療]	+00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて ドキソルビシン注 生理食塩液 100mL	25 mg/m ² 100 mL	点滴 [化療]	+00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1時間かけて プレオ注射用 生理食塩液 100mL	10 mg/m ² 100 mL	点滴 [化療]	+00:30						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 150分かけて ダカルバジン注用 100 ブドウ糖注射液 5%500mL	375 mg/m ² 500 mL	点滴 [化療]	+01:30						

【備考】

腎機能低下時（ $CCr < 10 \text{ mL/min}$ 以下）はドキソルビシン 75%に減量。ブレオは $CCr : 30, \text{L/min}$ 以下で禁忌、

ダカルバジンは 70%に減量を考慮。

ダカルバジンの血管痛に注意。

ドキソルビシンの総投与量は 500 mg/m^2 以下にすること。