

レジメン名：Azacitidine 療法

【適応癌腫】 骨髄異形成症候群

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 中度

・皮下注

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) IVIにつき注射用水4mL ピダーザ注射用 100mg	皮下注[化療] 75 mg/m ²		+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00

・静注

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1 Vにつき注射用水10mL ピダーザ注射用 100mg 生理食塩液 50mL	点滴[化療] 10分かけて 75 mg/m ² 50 mL		+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00

【備考】

アザシチジン投与中はナゼアの処方考慮。

定期的に血清重炭酸塩および腎機能の確認が必要。