

レジメン名：CPT-11 + Cmab 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラネセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 3 mg 6.6 mg 100 mL		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 Rp01終了後30分空けて開始 250 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 90分かけて イリノテカン点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 150 mg/m ² 250 mL		+03:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

※注意
初回のみ 400mg/m²
2回目以降 250mg/m²

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 6.6 mg 100 mL		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 Rp01終了後30分空けて開始 250 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 02	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 6.6 mg 100 mL		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 Rp01終了後30分空けて開始 250 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 02	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL		点滴静注 (速度入力なし)	+00:00						
		6.6 mg 100 mL								
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして 1時間かけて 【用時】アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL		点滴【化療】 Rp01終了後30分空けて開始	+01:00						
		250 mg/m ² 250 mL								
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg		※化学療法内服	+00:00						
		5 錠								

【備考】

UGT1A1*6*28 のホモ接合体、またはヘテロ接合体を有する場合は CPT-11 を 150mg/m² から 120mg/m² への減量を考慮。必要時に下痢予防として半夏瀉心湯 7.5g/3x を治療前日から考慮。

セツキシマブは初回のみ 400mg/m²、2 回目以降 250mg/m²