

**レジメン名：Cabazitaxel + PTX 療法**

【適応癌腫】 前立腺癌

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 軽度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 ファモチジン注用 20 「トワ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ボララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL	点滴静注 20 mg 6.6 mg 5 mg 50 mL	212ml/時	+00:00						
Rp 02	点滴注射 生理食塩液 100mL	点滴静注 100 mL	200ml/時	+00:15						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 60分かけて ジェブタナ点滴静注 60mg/6mL ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 25 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+00:45						
Rp 04	点滴注射 生理食塩液 50mL	点滴静注 50 mL	300ml/時	+01:45						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝食後 21日間連日投与 ブレドニン錠 5mg	※化学療法内服 10 mg/Body		+00:00	—————▶					

【備考】

好中球減少が多く発生するため、感染予防として手洗い嗽などの徹底。

過敏症反応を抑制するため、前投与はしっかり行うこと。