

レジメン名：DBd (皮下注) 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫症

【1 コースの期間】 21 日 (1～8 コース目)、28 日 (9 コース目以降) 【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 最小

※1～3 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15	mL/Body 【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	1.3 0.52	mg/m ² mL/m ²	+00:00			+00:00			
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 80mg/week レナデックス錠 4mg	5	錠	00:00	00:00		00:00	00:00		
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	2 5	錠 錠	00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15	mL/Body 【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	1.3 0.52	mg/m ² mL/m ²	+00:00			+00:00			
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 80mg/week レナデックス錠 4mg	5	錠	00:00	00:00		00:00	00:00		
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	2 5	錠 錠	00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15	mL/Body 【冷所保存】	+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 80mg/week レナデックス錠 4mg	5	錠	00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	2 5	錠 錠	00:00						

※4～8 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキュロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00			+00:00			
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 5 錠		00:00	00:00		00:00	00:00		
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)		
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00			+00:00			
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 5 錠		00:00	00:00		00:00	00:00		

※9 コース目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)						
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキュロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						

【備考】

Infusion reaction に中止が必要。

ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。G1/2(痛みなし)減量規定： 1.0mg/m²→0.7mg/m²→投与中止。

ST 合剤、アシクロピルの予防投与が推奨。