

レジメン名：DCyBorD 療法

【適応癌腫】 全身性アミロイドーシス

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

※1～2 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3～5分かけて ダラキユーロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1分かけて ペルケイド注射用 3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1～3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1～3時間前 カロナル錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3～5分かけて ダラキユーロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1分かけて ペルケイド注射用 3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1～3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1～3時間前 カロナル錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3~5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ベルケイト注射用 3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1~3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1~3時間前 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3~5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ベルケイト注射用 3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1~3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1~3時間前 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

※ 3～6 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	皮下注 [化療] 15 mL/Body	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ベルケイト注射用 3mg 生理食塩液	皮下注 [化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 カロナル錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ベルケイト注射用 3mg 生理食塩液	皮下注 [化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	速度指示 【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ベルケイト注射用 3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1分かけて ベルケイト注射用 3mg 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 デカドロン錠 70歳以上20mgへ減量	※化学療法内服 40 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) エンドキサンの前に内服 ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量500mg エンドキサン錠 50mg	※化学療法内服 300 mg/m ²		00:00						

※7 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3～5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body	速度指示 【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 デカドロン錠	※化学療法内服 20 mg/Body		00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1～3時間前 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

【備考】

ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。G1/2(痛みなし)減量規定： 1.0mg/m²→0.7mg/m²→投与中止。

ST 合剤、アシクロビルの予防投与が推奨。

催吐性リスクが中度であるため、必要に応じてメトクロプラミドなどを追加、もしくは 5HT₃阻害薬の追加を考慮すること。