

## レジメン名：FOLFIRI + BV 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「有り」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 3 mg 9.9 mg 100 mL		+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 100mLとして アバスチン点滴静注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 90分かけて 5 mg/kg 100 mL		+00:30						
Rp 03	点滴注射 側管でイリノテカンと同時に レボホリナート点滴静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴静注 (速度入力なし) 2時間かけて 200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+02:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 側管でレボホリナートと同時に イリノテカン点滴静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 90分かけて 150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+02:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レボホリナート終了後 フルオロウラシル注 生理食塩液 20mL	静注【化療】 400 mg/m <sup>2</sup> 20 mL		+04:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 速度: 5mL/hにて インフューザーポンプ使用 フルオロウラシル注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 全量: 230mLとして 46時間かけて 2400 mg/m <sup>2</sup> 230 mL		+04:00						

### 【備考】

UGT1A1\*6\*28 のホモ接合体、またはヘテロ接合体を有する場合は CPT-11 を 150mg/m<sup>2</sup> から 120mg/m<sup>2</sup> への減量を考慮

必要時に下痢予防として半夏瀉心湯 7.5g/3x を治療前日から考慮

アバスチンの投与速度は 90 分→60 分→30 分と短縮可能