

レジメン名：FOLFIRI + Cmab 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	3 mg 9.9 mg 100 mL	点滴静注（速度入力なし）	+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量：250mLとして 2時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	400 mg/m ² 250 mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始	+01:00	※注意 初回のみ 400mg/m ² （120分） 2回目以降 250mg/m ² （60分）					
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 側管でレボホリナートと同時に イリノテカン点滴静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	150 mg/m ² 250 mL	点滴[化療] 90分かけて	+03:30						
Rp 04	点滴注射 2時間かけて レボホリナート点滴静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注（速度入力なし） 側管でイリノテカンと同時に	+03:30						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） フルオロウラシル注 生理食塩液 20mL	400 mg/m ² 20 mL	静注[化療]	+05:30						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 速度：5mL/hにて インフューザーポンプ使用 フルオロウラシル注 生理食塩液 250mL	2400 mg/m ² 230 mL	点滴[化療] 全量：230mLとして 46時間かけて	+05:30						
Rp 09	※化学療法（薬剤部ミキシング） Rp1, Rp7のD1V終了時5錠内服 レスタミンコーワ錠 10mg	5 錠	※化学療法内服	+01:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)						
Rp 07	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	9.9 mg 100 mL	点滴静注（速度入力なし）	+00:00						
Rp 08	※化学療法（薬剤部ミキシング） 60分かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	250 mg/m ² 250 mL	点滴[化療]	+01:00						
Rp 09	※化学療法（薬剤部ミキシング） Rp1, Rp7のD1V終了時5錠内服 レスタミンコーワ錠 10mg	5 錠	※化学療法内服	+01:00						

【備考】

セツキシマブは初回のみ 400mg/m²、2回目以降 250mg/m²

UGT1A1*6*28 のホモ接合体、またはヘテロ接合体を有する場合は CPT-11 を 150mg/m² から 120mg/m² への減量を考慮。必要時に下痢予防として半夏瀉心湯 7.5g/3x を治療前日から考慮。