

レジメン名：FOLFIRI+Rmab 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「サリ」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL ボラミン注 5mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 3 mg 9.9 mg 5 mg 100 mL		+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量250mLとして サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 60分かけて 8 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 03	点滴注射 15分かけて 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし) 50 mL		+01:30						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 側管でレボホリナートと同時に イリノテカン点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 90分かけて 150 mg/m ² 250 mL		+01:45						
Rp 05	点滴注射 側管でイリノテカンと同時に レボホリナート点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴静注 (速度入力なし) 2時間かけて 200 mg/m ² 250 mL		+01:45						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) フルオロウラシル注 生理食塩液 20mL	静注【化療】 400 mg/m ² 20 mL		+03:45						
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 速度：5mL/hにて 46時間かけて フルオロウラシル注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 全量：230mLとして 2400 mg/m ² 250 mL		+03:45						

【備考】

UGT1A1*6*28 のホモ接合体、またはヘテロ接合体を有する場合は CPT-11 を 150mg/m² から 120mg/m² への減量を考慮。必要時に下痢予防として半夏瀉心湯 7.5g/3x を治療前日から考慮。

高血圧・凝固系以上に注意が必要。