

## レジメン名：Gemcitabine 療法

【適応癌腫】 膵臓癌

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「特イ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 6.6 mg 100 mL	210ml/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分厳守 ゲムシタビン点滴静注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 30分かけて 1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL		+00:30						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「特イ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 6.6 mg 100 mL	210ml/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分厳守 ゲムシタビン点滴静注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 30分かけて 1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL		+00:30						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
注射										
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「特イ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 6.6 mg 100 mL	210ml/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分厳守 ゲムシタビン点滴静注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 30分かけて 1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL		+00:30						

### 【備考】

- ・ 骨髄抑制時の減量基準

GEM : 1 段階減量 800mg/m<sup>2</sup>