

レジメン名：IRIS + Cmab 療法

【適応癌腫】 大腸癌/胃癌

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「有り」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 3 mg 9.9 mg 100 mL		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして 2時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始 400 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+01:00						
				※注意 初回のみ 400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 90分かけて イリノテカン点滴注 生理食塩液 500mL	点滴[化療] 100 mg/m <sup>2</sup> 500 mL		+04:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1.4日分 エスワンタイホウ配合OD錠	※化学療法内服 120 mg/Body		+00:00 +12:00						
				<1.25m <sup>2</sup> : 80mg/day 1.25~1.5m <sup>2</sup> : 100mg/day 1.5m <sup>2</sup> > : 120mg/day						
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 6.6 mg 100 mL		+00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250 mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始 250 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+01:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1.4日分 エスワンタイホウ配合OD錠	※化学療法内服 120 mg/Body								+00:00 +12:00

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「中」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 3 mg 9.9 mg 100 mL		+00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250 mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始 250 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+01:00						
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 90分かけて イリノテカン点滴静注 生理食塩液 500mL	点滴[化療] 100 mg/m <sup>2</sup> 500 mL		+03:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
Rp 02	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 6.6 mg 100 mL		+00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250 mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始 250 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+01:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

#### 【備考】

UGT1A1\*6\*28 のホモ接合体、またはヘテロ接合体を有する場合は CPT-11 の減量を考慮。必要時に下痢予防として半夏瀉心湯 7.5g/3x を治療前日から考慮。

TS1 の減量基準：非血液毒性(grade2 以上)、CCr<60mL/min→1 段階減量

好中球数 1000/mm<sup>3</sup>、血小板 75000/mm<sup>3</sup> 未満→1 段階減量

セツキシマブは初回のみ 400mg/m<sup>2</sup>、2 回目以降 250mg/m<sup>2</sup>