

レジメン名：Isatuximab 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 最小

※ 1 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボララミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分かけて ソルメドロール静注用 125mg 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし) 125 mg 50 mL		+00:15						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 20 mg/kg 250 mL		+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボララミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分かけて ソルメドロール静注用 125mg 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし) 125 mg 50 mL		+00:15						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 20 mg/kg 250 mL		+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボララミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分かけて ソルメドロール静注用 125mg 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし) 125 mg 50 mL		+00:15						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 20 mg/kg 250 mL		+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
Rp 01	点滴注射 15分かけて ボラミン注 5mg/1mL ファモチジン注用 20「ト-ワ」 生理食塩液 100mL	点滴静注 1 A 1 A 100 mL	404mL/時	+00:00						
Rp 02	点滴注射 15分かけて ソルメドロール静注用 125mg 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし) 125 mg 50 mL		+00:15						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 20 mg/kg 250 mL		+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロサル錠 200mg	※化学療法内服 4 錠		00:00						

※2コース目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 20 mg/kg 250 mL		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして サークリサ点滴静注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 20 mg/kg 250 mL		+00:00						

【備考】

- ・infusion reaction を来たす可能性があるため、投与速度に注意が必要。下記にはサークリサの体重、投与回数、時間別の表を示す。

投与速度 (mL/h)

経過時間	体重									
	50kg 以下		51kg~60kg		61kg~71kg		71kg~80kg		81kg~90kg	
	初回	2回目	初回	2回目	初回	2回目	初回	2回目	初回	2回目
0分	44	44	36	36	31	31	27	27	24	24
60分	56	69	47	57	40	49	35	43	31	38
90分	69	94	57	78	49	67	43	59	38	52
120分	81	100	68	83	58	71	51	63	45	56
150分	94		78		67		59		52	
180分	100		83		71		63		56	