

レジメン名：Pola + BR 療法

【適応癌腫】 リンパ腫

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 6 コース

【催吐性リスク】 中度

※初回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分ごとに50ml 1 /hrずつアップ リツキシマブBS点滴静注「KHK」 最大400ml/hまで 生理食塩液	点滴【化療】 開始量： 50ml/h 375 mg/m ² 375 mL/m ²		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 90分かけて ボライビー点滴静注用 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 1.8 mg/kg 100 mL	【冷所保存】		+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 10分かけて トレアキシン点滴静注液100mg/4mL 生理食塩液 50mL	点滴【化療】 90 mg/m ² 50 mL	【冷所保存】		+02:00	+00:00				
Rp 04	点滴注射 10分かけて 生理食塩液 100mL	点滴静注 100 mL	600ml/時		+02:10	+00:10				
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) カロナル錠 200mg 化学療法前に内服 ボララミン錠 2mg	※化学療法内服 2 錠 1 錠		00:00	00:00					
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ナゼアOD錠 0.1mg トレアキシン前に内服	※化学療法内服 1 錠			00:00	00:00				

※2回目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)						
Rp 01	※化学療法(薬剤部ミキシング) 30分ごとに100mL/hずつアップ リツキシマブBS点滴静注「KHK」 最大400mL/hまで 生理食塩液	点滴【化療】 開始量: 100mL/h 375 mg/m ² 375 mL/m ²		+00:00							
Rp 02	※化学療法(薬剤部ミキシング) 30分かけて ボライビー点滴静注用 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 1.8 mg/kg 100 mL		+03:00							
注射											
Rp 03	※化学療法(薬剤部ミキシング) 10分かけて トレアキシシン点滴静注液100mg/4mL 生理食塩液 50mL	点滴【化療】 90 mg/m ² 50 mL		+03:30	+00:00						
Rp 04	点滴注射 10分かけて 生理食塩液 100mL	点滴静注 100 mL	600mL/時	+03:40	+00:10						
注射											
Rp 05	※化学療法(薬剤部ミキシング) カロナール錠 200mg 化学療法前に内服 ポララミン錠 2mg	※化学療法内服 2 錠 1 錠		00:00							
Rp 06	※化学療法(薬剤部ミキシング) ナゼアOD錠 0.1mg トレアキシシン前に内服	※化学療法内服 1 錠		00:00	00:00						

【備考】

初回時はリツキシマブとポラツズマブの併用を避けること、また両剤とも infusion reaction の頻度が高いため、投与時は注意が必要。

ポラツズマブ減量基準

末梢神経障害 G2、3 の場合は G1 まで休薬 1.4mg/kg に減量、再発した場合は中止。

リツキシマブの速度に注意 (MAX400mL/h)

トレアキシシン投与時の血管痛に注意が必要。1段階減量は 60mg/m²