

レジメン名：R- mini CHOP 療法

【適応癌腫】 リンパ腫

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 6-8 コース

【催吐性リスク】 高度

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1 回投与量 (補正単位) | 速度指示 | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) |
|-------|---|--|------|------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Rp 01 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分毎に100mL/hまでup可能 リツキサン点滴静注 400mL/hまでup可能 生理食塩液 | 点滴【化療】 開始量: 100mL/h 375 mg/m ² 375 mL/m ² | | +00:00 | | | | |
| Rp 02 | 静脈内注射 グラネセトロン静注液シリンジ 3mg | 静注 「ナリ」 3 mg | | +02:00 | | | | |
| Rp 03 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量2mg オンコビン注射用 1mg 生理食塩液 20mL | 静注【化療】 1分かけて 1 mg/m ² 20 mL | | +02:00 | | | | |
| Rp 04 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて ドキシソルピシン注 生理食塩液 100mL | 点滴【化療】 25 mg/m ² 100 mL | | +02:00 | | | | |
| Rp 05 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング) 2時間かけて 注射用エンドキサン 500mg 生理食塩液 500mL | 点滴【化療】 400 mg/m ² 500 mL | | +02:30 | | | | |
| 注射 | | | | | | | | |
| Rp 06 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング) 5日間 プレドニン錠 5mg | ※化学療法内服 40 mg/Body | | +02:00 +04:00 | | | | +00:00 +04:00 |
| Rp 07 | ※化学療法 (薬剤部ミキシング) リツキサン開始前に ポララミン錠 2mg カロナール錠 200mg | ※化学療法内服 1 錠 2 錠 | | +00:00 | | | | |

【備考】

主に 80 歳以上を対象としたレジメン。

リツキサンの速度に注意 (MAX400mL/h)、ドキシソルピシンの累積投与量 (500mg/m²)

プレドニンによる不眠、精神症状 (高揚感、倦怠感) 食欲などの症状が出現する可能性あり。

腎機能低下時 (CCr<10mL/min 以下) はドキシソルピシン 75%に減量、エンドキサン 50~75%に減量を考慮。

オンコビンの投与量は 1.0mg を上限とする。