

## レジメン名：R-CHOP 療法

【適応癌腫】 リンパ腫

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 6-8 コース

【催吐性リスク】 高度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分毎に100mL/hまでup可能 リツキサン点滴静注 400mL/hまでup可能 生理食塩液	点滴【化療】 開始量: 100mL/h 375 mg/m <sup>2</sup> 375 mL/m <sup>2</sup>		+00:00				
Rp 02	静脈内注射 グラネセトロン静注液シリンジ 3mg	静注 「ナリイ」 3 mg		+02:00				
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 限度量2mg オンコピン注射用 1mg 生理食塩液 20mL	静注【化療】 1分かけて 1.4 mg/m <sup>2</sup> 20 mL		+02:00				
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて ドキシソルピシン注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 50 mg/m <sup>2</sup> 100 mL		+02:00				
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 2時間かけて 注射用エンドキサン 500mg 生理食塩液 500mL	点滴【化療】 750 mg/m <sup>2</sup> 500 mL		+02:30				
注射								
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝12錠 昼8錠 5日分 プレドニン錠 5mg	※化学療法内服 100 mg/Body		+02:00 +04:00	→			+00:00 +04:00
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) リツキサン開始前に ボララミン錠 2mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 1 錠 2 錠		+00:00				

### 【備考】

リツキサンの速度に注意 (MAX400mL/h)、ドキシソルピシンの累積投与量 (500mg/m<sup>2</sup>)

プレドニンによる不眠、精神症状 (高揚感、倦怠感) 食欲などの症状が出現する可能性あり。

腎機能低下時 (CCr<10mL/min 以下) はドキシソルピシン 75%に減量、エンドキサン 50~75%に減量を考慮。

オンコピンの投与量は 2.0mg を上限とする。

ドキシソルピシンの総投与量は 500mg/m<sup>2</sup> 以下にすること。