

レジメン名：VRD（lite）療法 10～15 コース

【適応癌腫】 多発性骨髄腫症

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 5 コース

【催吐性リスク】 軽度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度：2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 7日分 レプラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 15 mg/Body		+00:00	→					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度：2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 7日分 レプラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 15 mg/Body		+00:00	→					

21日まで

【備考】

原則 6 5 歳以上で移植非適応患者に適応

ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。G1/2(痛みなし)減量規定：1.0mg/m²→0.7mg/m²→投与中止。

ST 合剤、アシクロピルの予防投与が推奨。