

レジメン名：VRD（lite）療法 1～9 コース

【適応癌腫】 多発性骨髄腫症

【1 コースの期間】 35 日 【最大コース数】 9 コース

【催吐性リスク】 軽度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度：2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 7日分 レブラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 15 mg/Body		+00:00	→					
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） day 2 9 16 23に追加可 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射										
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度：2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 7日分 レブラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 15 mg/Body		+00:00	→					
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） day 2 9 16 23に追加可 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射										
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度：2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 7日分 レブラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 15 mg/Body		+00:00	→					
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） day 2 9 16 23に追加可 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (22)						
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 濃度: 2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) day 2 9 16 23に追加可 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		+00:00						

【備考】

原則 6 5 歳以上で移植非適応患者に適応

ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。G1/2(痛みなし)減量規定: 1.0mg/m²→0.7mg/m²→投与中止。

ST 合剤、アシクロピルの予防投与が推奨。