

レジメン名：weekly - PTX 療法

【適応癌腫】 胃癌

【1 コースの期間】 28 日

【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 軽度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて 生理食塩液 100mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注用 20 「ナリ」 ボララミン注 5mg/1mL	点滴静注 100 mL 3 mg 13.2 mg 20 mg 5 mg	200mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Rp1 DIV後30分から開始 パクリタキセル点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 1時間かけて 80 mg/m ² 250 mL		+01:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 30分かけて 生理食塩液 100mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注用 20 「ナリ」 ボララミン注 5mg/1mL	点滴静注 100 mL 3 mg 13.2 mg 20 mg 5 mg	200mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Rp1 DIV後30分から開始 パクリタキセル点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 1時間かけて 80 mg/m ² 250 mL		+01:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 30分かけて 生理食塩液 100mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注用 20 「ナリ」 ボララミン注 5mg/1mL	点滴静注 100 mL 3 mg 13.2 mg 20 mg 5 mg	200mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) Rp1 DIV後30分から開始 パクリタキセル点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 1時間かけて 80 mg/m ² 250 mL		+01:00						

【備考】

パクリタキセル投与後のアルコール症状に注意 (PTX100mg でビール 170mL 相当)。

手足の痺れ等の確認が必要。