

レジメン名：SOX + NIVO 療法

【適応癌腫】 胃癌

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分かけて 【臨時】オプジーボ点滴静注 生理食塩液 100mL	点滴【化療】 360 mg/Body 100 mL 【混注不適】【冷所保存】		+00:00						
Rp 02	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「有り」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 9.9 mg 100 mL	212mL/時	+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 120分かけて オキサリプラチン点滴静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 130 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1.4日分 エスワントaiホウ配合OD錠 体表面積により用量調節必要	※化学療法内服 120 mg/Body		+00:00	→					
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・昼食後 (分2) 2日分 デカドロン錠	※化学療法内服 8 mg/Body		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1.4日分 エスワントaiホウ配合OD錠 体表面積により用量調節必要	※化学療法内服 120 mg/Body								+00:00 +12:00

【備考】

オキサリプラチンの累積投与量が 800~900mg/m² で末梢神経障害の出現率が増加。

減量は 130mg→100mg→75mg (好中球減少 grade3 以上、血小板減少 grade2 以上)

TS1 の減量基準：非血液毒性(grade2 以上)、CCr<60mL/min→1 段階減量

好中球数 1000/mm³、血小板 75000/mm³ 未満→1 段階減量

間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1 型糖尿病、肝障害、甲状腺機能障害、腎障害、副腎障害、血栓塞栓症などに注意が必要。また投与終了後に副作用が発現する可能性もある。