

## レジメン名：TS-1 + Docetaxel 療法

【適応癌腫】 胃癌

【1 コースの期間】 21 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 6.6 mg 100 mL	210mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 15分は50mL/h、残りを60分で投与 ワンタキソテル点滴静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴〔化療〕 75分かけて 40 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1 4 日分 エスワンタイボウ配合OD錠 体表面積により用量調節必要	※化学療法内服 120 mg/m <sup>2</sup>		+00:00						

<1.25m<sup>2</sup> : 80mg/day  
1.25~1.5m<sup>2</sup> : 100mg/day  
1.5m<sup>2</sup>> : 120mg/day

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 朝・夕食後 (分2) 1 4 日分 エスワンタイボウ配合OD錠 体表面積により用量調節必要	※化学療法内服 120 mg/Body								+00:00 +12:00

### 【備考】

TS1 の減量基準：非血液毒性(grade2 以上)、CCr<60mL/min→1 段階減量

好中球数 1000/mm<sup>3</sup>、血小板 75000/mm<sup>3</sup> 未満→1 段階減量

好中球減少が発生するため、感染症には注意が必要。悪心・嘔吐などが強い場合は 5HT<sub>3</sub>拮抗薬の追加処方を考慮