

レジメン名：RAM + PTX 療法

【適応癌腫】 胃癌

【1 コースの期間】 28 日

【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 軽度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて 生理食塩液 100mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注用 20 「ナリ」 ボララミン注 5mg/1mL.	点滴静注 (速度入力なし) 100 mL 3 mg 13.2 mg 20 mg 5 mg		+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして *サイラムザ点滴静注液 投与速度: 25mg/分を超えない 生理食塩液 250mL 蛋白質透過型フィルターを使用	点滴【化療】 1時間かけて 8 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1時間かけて バクリタキセル点静注 生理食塩液 250mL.	点滴【化療】 80 mg/m ² 250 mL		+01:30						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 30分かけて 生理食塩液 100mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注用 20 「ナリ」 ボララミン注 5mg/1mL.	点滴静注 (速度入力なし) 100 mL 3 mg 13.2 mg 20 mg 5 mg		+00:00						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1時間かけて バクリタキセル点静注 生理食塩液 250mL.	点滴【化療】 80 mg/m ² 250 mL		+00:30						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
Rp 01	点滴注射 30分かけて 生理食塩液 100mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 6.6mg/2mL ファモチジン注用 20 「ナリ」 ボララミン注 5mg/1mL.	点滴静注 (速度入力なし) 100 mL 3 mg 13.2 mg 20 mg 5 mg		+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量: 250mLとして *サイラムザ点滴静注液 投与速度: 25mg/分を超えない 生理食塩液 250mL 蛋白質透過型フィルターを使用	点滴【化療】 1時間かけて 8 mg/kg 250 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1時間かけて バクリタキセル点静注 生理食塩液 250mL.	点滴【化療】 80 mg/m ² 250 mL		+01:30						

【備考】

サイラムザによる蛋白尿、高血圧、肝障害に注意。

パクリタキセル投与後のアルコール症状に注意（PTX100mg でビール 170mL 相当。）