

レジメン名：mFOLFOX6 + BV 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「ナリ」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 3 mg 9.9 mg 100 mL	212mL/時	+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量：100mLとして アバスチン点静注 生理食塩液 100mL	点滴〔化療〕 90分かけて 5 mg/kg 100 mL		+00:30						
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 側管でレボホリナートと同時に オキサリプラチン点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴〔化療〕 2時間かけて 85 mg/m ² 250 mL		+02:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 側管でオキサリプラチンと同時に レボホリナート点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴〔化療〕 2時間かけて 200 mg/m ² 250 mL		+02:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) フルオロウラシル注 生理食塩液 20mL	静注〔化療〕 400 mg/m ² 20 mL		+04:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 速度：5mL/hにて インフューザーポンプ使用 フルオロウラシル注 生理食塩液 250mL	点滴〔化療〕 全量：230mLとして 46時間かけて 2400 mg/m ² 230 mL		+04:00						

【備考】

アバスチンの投与速度は 90 分→60 分→30 分と短縮可能

オキサリプラチンの累積投与量が 800~900mg/m² で末梢神経障害の出現率が増加