

レジメン名：mFOLFOX6 + Cmab 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 30分かけて グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 「+R1」 デカドロン注射液 3.3mg/1mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 3 mg 9.9 mg 100 mL		+00:00						
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量：250mLとして 2時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始 400 mg/m ² 250 mL		+01:00	※注意 初回のみ 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²					
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 側管でレボホリナートと同時に オキサリプラチン点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴[化療] 2時間かけて 85 mg/m ² 250 mL		+04:00						
Rp 04	点滴注射 側管でオキサリプラチンと同時に レボホリナート点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴静注 (速度入力なし) 2時間かけて 200 mg/m ² 250 mL		+04:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) フルオウラシル注 生理食塩液 20mL	静注[化療] 400 mg/m ² 20 mL		+06:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 速度：5mL/hにて 46時間かけて フルオウラシル注 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 全量：230mLとして 2400 mg/m ² 230 mL		+06:00						
Rp 09	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
Rp 07	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 6.6mg/2mL 生理食塩液 100mL	点滴静注 (速度入力なし) 6.6 mg 100 mL		+00:00						
Rp 08	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 全量：250mLとして 1時間かけて [用時]アービタックス注射液 100mg/20mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 制吐剤投与終了後、30分空けて開始 250 mg/m ² 250 mL		+01:00						
Rp 09	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 5 錠		+00:00						

【備考】

セツキシマブは初回のみ 400mg/m²、2回目以降 250mg/m²

オキサリプラチンの累積投与量が 800~900mg/m² で末梢神経障害の出現率が増加