

## レジメン名：mFOLFOX6 療法

【適応癌腫】 大腸癌

【1 コースの期間】 14 日 【最大コース数】 - コース

【催吐性リスク】 中度

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 30分かけて デカドロン注射液 3.3mg/1mL グラニセトロン静注液シリンジ 3mg 【9/9】 生理食塩液 100mL	点滴静注（速度入力なし） 9.9 mg 3 mg 100 mL		+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 側管でレボホリナートと同時に オキサリプラチン点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴【化療】 2時間かけて 85 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+00:30						
Rp 03	点滴注射 側管でオキサリプラチンと同時に レボホリナート点静注 ブドウ糖注射液 5%250mL	点滴静注（速度入力なし） 2時間かけて 200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL		+00:30						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） オキサリプラチン、レボホリナート終 フルオロウラシル注 生理食塩液 20mL	静注【化療】 400 mg/m <sup>2</sup> 20 mL		+02:30						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） 速度：5mL/hにて インフューザーポンプ使用 フルオロウラシル注 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 全量：230mLとして 46時間かけて 2400 mg/m <sup>2</sup> 230 mL		+02:30						

### 【備考】

オキサリプラチンの累積投与量が 800~900mg/m<sup>2</sup> で末梢神経障害の出現率が増加