

レジメン名：obinutuzumab + bendamustine 療法

【適応癌腫】 リンパ腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 全 6 コース

【催吐性リスク】 中度

※ 1 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし) 16.5 mg/Body 50 mL		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 10分かけて トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 生理食塩液 50mL	点滴【化療】 90 mg/m ² 50 mL	600mL/時 【冷所保存】	+00:00	+00:00					
Rp 03	点滴注射 10分かけて 生理食塩液 100mL	点滴静注 10分かけて 100 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分ごとに12mL/hずつup MAX: 100mL/hまで 【用時】ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 開始量: 12mL/h 全量: 250mLとして 1000 mg/Body 250 mL		+01:00						
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服 1 錠		+00:00	+00:00					

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分ごとに25mL/hずつup MAX: 100mL/hまで 【用時】ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 開始量: 25mL/h 全量: 250mLとして 1000 mg/Body 250 mL		+00:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (15)						
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分ごとに25mL/hずつup MAX: 100mL/hまで 【用時】ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 開始量: 25mL/h 全量: 250mLとして 1000 mg/Body 250 mL		+00:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

※2 コース目

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)					
Rp 01	点滴注射 15分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 50mL	点滴静注 (速度入力なし)	16.5 mg/Body 50 mL	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 10分かけて トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 生理食塩液 50mL	点滴【化療】	90 mg/m ² 50 mL	+00:00	+00:00					【冷所保存】
Rp 03	点滴注射 10分かけて 生理食塩液 100mL	点滴静注	600mL/時 100 mL	+00:00	+00:00					
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分後に225mL/hicup 全量: 250mLとして [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 開始量: 25mL/h	1000 mg/Body 250 mL	+01:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服	2 錠 5 錠	00:00						
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服	1 錠	+00:00	+00:00					

※3 コース目以降

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)					
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 10分かけて トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 生理食塩液 50mL	点滴【化療】	90 mg/m ² 50 mL	+00:00	+00:00					【冷所保存】
Rp 02	点滴注射 10分かけて 生理食塩液 100mL	点滴静注	600mL/時 100 mL	+00:00	+00:00					
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 30分後に225mL/hicup 全量: 250mLとして [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴【化療】 開始量: 25mL/h	1000 mg/Body 250 mL	+01:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服	2 錠 5 錠	00:00						
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ナゼアOD錠 0.1mg	※化学療法内服	1 錠	+00:00	+00:00					

【備考】

ガザイバの速度、および infusion reaction に注意。

トリアキシン投与時の血管痛に注意が必要。1段階減量は 60mg/m²