

レジメン名：Dara-VRD (移植非適応)療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 1～8 コース目：21 日、9 コース目以降：28 日

【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 最小度

<1～2 コース目>

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント                                                                               | 1 回投与量（補正単位）                                                 | 速度指示   | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>3-5分かけて<br>ダラキューロ配合皮下注(15mL)                                           | 皮下注[化療]<br>15 mL/Body                                        | 【冷所保存】 | +00:00  |         |         |         |         |         |         |
| 注射    |                                                                                           |                                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 02 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ボルテゾミブ注射用3mg<br>濃度2.5mg/mL<br>生理食塩液                                    | 皮下注[化療]<br>1.3 mg/mL <sup>2</sup><br>0.52 mL/mL <sup>2</sup> |        | +00:00  |         |         | +00:00  |         |         |         |
| 注射    |                                                                                           |                                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>1日1回14日間<br>レブラミドカプセル 5mg                                              | ※化学療法内服<br>25 mg/Body                                        |        | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| 注射    |                                                                                           |                                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 04 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1-3時間前<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                               | ※化学療法内服<br>5 錠                                               |        | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| 注射    |                                                                                           |                                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 05 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                                             | ※化学療法内服<br>5 錠                                               |        |         | 00:00   |         | 00:00   | 00:00   |         |         |
| 注射    |                                                                                           |                                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 06 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1-3時間前<br>カロナール錠 300mg<br>最大1000mgまで<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>最大50mgまで | ※化学療法内服<br>2 錠<br>5 錠                                        |        | 00:00   |         |         |         |         |         |         |

14 日目まで

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                               | 1回投与量（補正単位）                                                        | 速度指示   | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>3-5分かけて<br>ダラキューロ配合皮下注(15mL)                                           | 皮下注[化療]<br><br>15 mL/Body                                          | 【冷所保存】 | +00:00  |         |          |          |          |          |          |
| 注射         |                                                                                           |                                                                    |        |         |         |          |          |          |          |          |
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ボルテゾミブ注射用3mg<br>濃度2.5mg/mL<br>生理食塩液                                    | 皮下注[化療]<br><br>1.3 mg/m <sup>2</sup><br><br>0.52 mL/m <sup>2</sup> |        | +00:00  |         |          | +00:00   |          |          |          |
| 注射         |                                                                                           |                                                                    |        |         |         |          |          |          |          |          |
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1-3時間前<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                               | ※化学療法内服<br><br>5 錠                                                 |        | 00:00   |         |          |          |          |          |          |
| 注射         |                                                                                           |                                                                    |        |         |         |          |          |          |          |          |
| Rp 05      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                                             | ※化学療法内服<br><br>5 錠                                                 |        |         | 00:00   |          | 00:00    | 00:00    |          |          |
| Rp 06      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1-3時間前<br>カロナール錠 300mg<br>最大1000mgまで<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>最大50mgまで | ※化学療法内服<br><br>2 錠<br><br>5 錠                                      |        | 00:00   |         |          |          |          |          |          |

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                               | 1回投与量（補正単位）                   | 速度指示   | day (15) |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>3-5分かけて<br>ダラキューロ配合皮下注(15mL)                                           | 皮下注[化療]<br><br>15 mL/Body     | 【冷所保存】 | +00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1-3時間前<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                               | ※化学療法内服<br><br>5 錠            |        | 00:00    |  |  |  |  |  |  |
| Rp 06      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1-3時間前<br>カロナール錠 300mg<br>最大1000mgまで<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>最大50mgまで | ※化学療法内服<br><br>2 錠<br><br>5 錠 |        | 00:00    |  |  |  |  |  |  |

<3～8 コース目>

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                               | 1回投与量（補正単位）                                     | 速度指示    | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>3～5分かけて<br>ダラキューロ配合皮下注(15mL)                                           | 15 mL/Body<br>【冷所保存】                            | 皮下注[化療] | +00:00  |         |         |         |         |         |         |
| 注射         |                                                                                           |                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ボルテゾミブ注射用3mg<br>濃度2.5mg/mL<br>生理食塩液                                    | 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>0.52 mL/m <sup>2</sup> | 皮下注[化療] | +00:00  |         |         | +00:00  |         |         |         |
| 注射         |                                                                                           |                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>1日1回14日間<br>レプラミドカプセル 5mg                                              | 25 mg/Body                                      | ※化学療法内服 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1～3時間前<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                               | 5 錠                                             | ※化学療法内服 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| 注射         |                                                                                           |                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 05      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                                             | 5 錠                                             | ※化学療法内服 |         | 00:00   |         | 00:00   | 00:00   |         |         |
| Rp 06      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1～3時間前<br>カロナール錠 300mg<br>最大1000mgまで<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>最大50mgまで | 2 錠<br>5 錠                                      | ※化学療法内服 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |

14日目まで

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                            | 1回投与量（補正単位）                                     | 速度指示    | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--|--|
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ボルテゾミブ注射用3mg<br>濃度2.5mg/mL<br>生理食塩液 | 1.3 mg/m <sup>2</sup><br>0.52 mL/m <sup>2</sup> | 皮下注[化療] | +00:00  |         |          | +00:00   |          |  |  |
| 注射         |                                                        |                                                 |         |         |         |          |          |          |  |  |
| Rp 05      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮          | 5 錠                                             | ※化学療法内服 | 00:00   | 00:00   |          | 00:00    | 00:00    |  |  |

<9 コース目以降>

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                               | 1回投与量（補正単位）          | 速度指示    | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>3～5分かけて<br>ダラキューロ配合皮下注(15mL)                                           | 15 mL/Body<br>【冷所保存】 | 皮下注[化療] | +00:00  |         |         |         |         |         |         |
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>1日1回21日間<br>レプラミドカプセル 5mg                                              | 25 mg/Body           | ※化学療法内服 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1～3時間前<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮                               | 10 錠                 | ※化学療法内服 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| Rp 05      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>治療開始1～3時間前<br>カロナール錠 300mg<br>最大1000mgまで<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>最大50mgまで | 2 錠<br>5 錠           | ※化学療法内服 | 00:00   |         |         |         |         |         |         |

21日目まで

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                   | 1回投与量（補正単位）    | 速度指示 | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮 | ※化学療法内服<br>10錠 |      | 00:00   |         |          |          |          |          |          |

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                   | 1回投与量（補正単位）    | 速度指示 | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮 | ※化学療法内服<br>10錠 |      | 00:00    |          |          |          |          |          |          |

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                   | 1回投与量（補正単位）    | 速度指示 | day (22) |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>レナデックス錠 4mg<br>75歳以上は減量を考慮 | ※化学療法内服<br>10錠 |      | 00:00    |  |  |  |  |  |  |

#### 【備考】

- ・腎機能に応じてレブラミドの投与量調整が必要。

CCr $\geq$ 60mL/min：25mg/day

30 $\leq$ CCr<60mL/min：10mg/day

- ・デキサメタゾン は 75 歳を超える場合は減量を考慮。
- ・ダラツズマブの Infusion reaction に注意が必要。
- ・ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。毒性に応じて減量(1.0mg/m<sup>2</sup>→0.7mg/m<sup>2</sup>→投与中止)。
- ・ST 合剤、アシクロビルの予防投与が推奨。