

レジメン名：Dara-VRD (移植適応)療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 最小度

<1～2 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15 mL/Body	皮下注[化療] 【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 濃度2.5mg/mL 生理食塩液	1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²	皮下注[化療]	+00:00			+00:00			
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 1日1回 21日間 レプラミドカプセル 5mg	25 mg/Body	※化学療法内服	00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg	10 錠	※化学療法内服	00:00						
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	10 錠	※化学療法内服		00:00	00:00	00:00			
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	2 錠 5 錠	※化学療法内服	00:00						

21 日目まで

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	15 mL/Body	皮下注[化療] 【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) ボルテゾミブ注射用3mg 濃度2.5mg/mL 生理食塩液	1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²	皮下注[化療]	+00:00			+00:00			
注射										
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) レナデックス錠 4mg	10 錠	※化学療法内服		00:00	00:00	00:00	00:00		
注射										
Rp 06	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg デカドロン錠でも可	2.5 錠	※化学療法内服	00:00						
Rp 07	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	2 錠 5 錠	※化学療法内服	00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg デカドロン錠でも可	※化学療法内服 2.5 錠		00:00						
Rp 07	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 コロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (22)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg デカドロン錠でも可	※化学療法内服 2.5 錠		00:00						
Rp 07	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 コロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

<3～6 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注 (15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/mL ² 0.52 mL/mL ²		+00:00			+00:00			
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 1日1回 21日間 レブラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 25 mg/Body		00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠		00:00						
注射										
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠			00:00	00:00	00:00			
Rp 07	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 コロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

21日目まで

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） ボルテゾミブ注射用3mg 濃度2.5mg/mL 生理食塩液	皮下注[化療] 1.3 mg/m ² 0.52 mL/m ²		+00:00			+00:00			
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 10 錠			00:00	00:00	00:00	00:00		

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg デカドロン錠でも可	※化学療法内服 2.5 錠		00:00						
Rp 07	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

<7 コース目以降>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 3-5分かけて ダラキューロ配合皮下注(15mL)	皮下注[化療] 15 mL/Body 【冷所保存】		+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 連日投与 レブラミドカプセル 5mg	※化学療法内服 10 mg/Body		00:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 レナデックス錠 4mg デカドロン錠でも可	※化学療法内服 2.5 錠		00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前 カロナール錠 300mg 最大1000mgまで レスタミンコーワ錠 10mg 最大50mgまで	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

連日投与

【備考】

- ・腎機能に応じてレナリドミドの投与量調整が必要。

CCr≧50mL/min：1～6 コース目 25mg/day

7 コース目以降 10mg/day(12 週間投与後に忍容性があれば 15mg/day に増量可)

30≦CCr<50mL/min：1～6 コース目 10mg/day、7 コース目以降 5mg/day

- ・ダラツズマブの Infusion reaction に注意が必要。
- ・ボルテゾミブによる末梢神経障害に注意。毒性に応じて減量(1.0mg/m²→0.7mg/m²→投与中止)。
- ・ST 合剤、アシクロビルの予防投与が推奨。