

レジメン名： Elranatamab 療法

- 【適応癌腫】 多発性骨髄腫
- 【1 コースの期間】 1 週目：1 日目、4 日目に投与、2～24 週目：1 週間に 1 回投与
25～48 週目：2 週間に 1 回投与、49 週目以降：4 週間に 1 回投与
- 【最大コース数】 -
- 【催吐性リスク】 軽度

<1 週目>

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)			
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量： 0.3mLとして エルレフィオ皮下注	皮下注[化療] 12 mg/Body	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量： 0.8mLとして エルレフィオ皮下注	皮下注[化療] 32 mg/Body	【冷所保存】				+00:00			
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始 1 時間前に投与 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00			00:00			
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始 1 時間前に投与 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 300mg	※化学療法内服 5 錠 2 錠		00:00			00:00			

<2 週目>

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量： 1.9mLとして エルレフィオ皮下注	皮下注[化療] 76 mg/Body	【冷所保存】	+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始 1 時間前に投与 レナデックス錠 4mg	※化学療法内服 20 mg		00:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始 1 時間前に投与 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 300mg	※化学療法内服 5 錠 2 錠		00:00						

<3～24 週目>

1 週間に 1 回投与

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量： 1.9mLとして エルレフィオ皮下注	皮下注[化療] 76	mg/Body 【冷所保存】	+00:00						

<25～48 週目>

2 週間に 1 回投与

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量： 1.9mLとして エルレフィオ皮下注	皮下注[化療] 76	mg/Body 【冷所保存】	+00:00						

<49 週目以降>

4 週間に 1 回投与

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 全量： 1.9mLとして エルレフィオ皮下注	皮下注[化療] 76	mg/Body 【冷所保存】	+00:00						

【備考】

- ・ 初回投与(12mg)投与後 48 時間、2 回目の投与(32mg)投与後 2 4 時間は必ず入院管理。
- ・ CRS 軽減のため、エルラナタマブ投与 1 日目、4 日目、8 日目の投与開始の約 1 時間前に解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤を投与。
- ・ ICANS が疑われる症状(失語症、意識レベルの変化、認知機能の障害、筋力低下等)に注意。
- ・ ST 合剤、アシクロピルの予防投与を推奨。
- ・ CMV の再活性化に注意。
- ・ 低 γ グロブリン血症に注意。定期的なモニタリングを推奨。