

レジメン名： Mosunetuzumab 療法

- 【適応癌腫】 再発または難治性の濾胞性リンパ腫
- 【1 コースの期間】 21 日
- 【最大コース数】 8 コース ※SD または PR の場合は 17 コースまで継続
- 【催吐性リスク】 軽度

<1 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30秒～2分かけて ルンスミオ皮下注	皮下注[化療] 5 mg/Body 【冷所保存】		+01:00						
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 投与60分前に内服 デカドロン錠	※化学療法内服 20 mg/Body		+00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 投与60分前に内服 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		+00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30秒～2分かけて ルンスミオ皮下注	皮下注[化療] 45 mg/Body 【冷所保存】		+01:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 投与60分前に内服 デカドロン錠	※化学療法内服 20 mg/Body		+00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 投与60分前に内服 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		+00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30秒～2分かけて ルンスミオ皮下注	皮下注[化療] 45 mg/Body 【冷所保存】		+01:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 投与60分前に内服 デカドロン錠	※化学療法内服 20 mg/Body		+00:00						
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 投与60分前に内服 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		+00:00						

<2～17 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30秒～2分かけて ルンスミオ皮下注	皮下注[化療] 45	mg/Body 【冷所保存】	+00:00						

【備考】

- ・ 1 コース目の初回(5mg)投与開始後 48 時間は入院管理。
- ・ CRS 軽減のため、1 サイクル目はモスネツズマブ投与前に副腎皮質ホルモンを投与。必要に応じて解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤を投与。
- ・ ICANS が疑われる症状(失語症、意識レベルの変化、認知機能の障害、筋力低下等)に注意。
- ・ ST 合剤、アシクロビルの予防投与を考慮。