

レジメン名： TafaR2 療法

【適応癌腫】 再発または難治の濾胞性リンパ腫

【1 コースの期間】 28 日 【最大コース数】 12 コース

【催吐性リスク】 軽度

<1 コース目>

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント                                                                  | 1 回投与量（補正単位）                                            | 速度指示   | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 注射    |                                                                              |                                                         |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 01 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度： 30分後、110mL/hへ<br>全量： 250mLとして<br>[臨時]ミンジュビ点滴静注用 200mg | 点滴[化療]<br>開始量： 70mL/h<br>12 mg/kg                       | 【冷所保存】 | +01:00  |         |         |         |         |         |         |
|       | 生理食塩液 250mL ※                                                                | 250 mL                                                  |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>1時間後100mL/h、200mL/hへ<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」<br>生理食塩液 500mL  | 点滴[化療]<br>25mL/hより開始<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL |        | +03:30  |         |         |         |         |         |         |
| 注射    |                                                                              |                                                         |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 05 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>デカドロン錠                                 | ※化学療法内服<br>20 mg/Body                                   |        | +00:00  |         |         |         |         |         |         |
| 注射    |                                                                              |                                                         |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 06 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>Day 1-21<br>レブラミドカプセル 5mg                                 | ※化学療法内服<br>20 mg/Body                                   |        | 00:00   |         |         |         |         |         |         |
| 注射    |                                                                              |                                                         |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 07 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>カロナール錠 200mg         | ※化学療法内服<br>50 mg<br>800 mg                              |        | +00:00  |         |         |         |         |         |         |

| RpNo  | 薬剤名/手技/コメント                                                          | 1 回投与量（補正単位）                                                 | 速度指示   | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 注射    |                                                                      |                                                              |        |         |         |          |          |          |          |          |
| Rp 02 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度： 125mL/hにて<br>[臨時]ミンジュビ点滴静注用 200mg             | 点滴[化療]<br>全量： 250mLとして<br>12 mg/kg                           | 【冷所保存】 | +01:00  |         |          |          |          |          |          |
|       | 生理食塩液 250mL ※※                                                       | 250 mL                                                       |        |         |         |          |          |          |          |          |
| Rp 04 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>開始量： 100mL/h<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」<br>生理食塩液 500mL  | 点滴[化療]<br>1時間後、200mL/hへUP<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL |        | +03:00  |         |          |          |          |          |          |
| Rp 05 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>デカドロン錠                         | ※化学療法内服<br>20 mg/Body                                        |        | +00:00  |         |          |          |          |          |          |
| Rp 07 | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>カロナール錠 200mg | ※化学療法内服<br>50 mg<br>800 mg                                   |        | +00:00  |         |          |          |          |          |          |

21 日間内服

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                   | 1回投与量（補正単位）                                                  | 速度指示   | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度：125mL/hにて<br>【臨時】ミンジュビ点滴静注用 200mg<br><br>生理食塩液 250mL ※※ | 点滴【化療】<br>全量：250mLとして<br>12 mg/kg<br><br>250 mL              | 【冷所保存】 | +01:00   |          |          |          |          |          |          |
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>開始量：100mL/h<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」<br>生理食塩液 500mL            | 点滴【化療】<br>1時間後、200mL/hへUP<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL |        | +03:00   |          |          |          |          |          |          |
| Rp 05      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>デカドロン錠                                  | ※化学療法内服<br><br>20 mg/Body                                    |        | +00:00   |          |          |          |          |          |          |
| Rp 07      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>カロナール錠 200mg          | ※化学療法内服<br><br>50 mg<br>800 mg                               |        | +00:00   |          |          |          |          |          |          |

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                   | 1回投与量（補正単位）                                                  | 速度指示   | day (22) |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度：125mL/hにて<br>【臨時】ミンジュビ点滴静注用 200mg<br><br>生理食塩液 250mL ※※ | 点滴【化療】<br>全量：250mLとして<br>12 mg/kg<br><br>250 mL              | 【冷所保存】 | +01:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 04      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>開始量：100mL/h<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」<br>生理食塩液 500mL            | 点滴【化療】<br>1時間後、200mL/hへUP<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL |        | +03:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 05      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>デカドロン錠                                  | ※化学療法内服<br><br>20 mg/Body                                    |        | +00:00   |  |  |  |  |  |  |
| Rp 07      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>ミンジュビ投与の60分前に内服<br>レスタミンコーワ錠 10mg<br>カロナール錠 200mg          | ※化学療法内服<br><br>50 mg<br>800 mg                               |        | +00:00   |  |  |  |  |  |  |

※ 体重 42kg 未満の場合、生理食塩液 全量 100mL、速度 40mL/h で投与

※※ 体重 42kg 未満の場合、生理食塩液 全量 100mL、速度 50mL/h で投与

<2～3 コース目>

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                               | 1 回投与量（補正単位）                                                 | 速度指示   | day (1)  | day (2)  | day (3)  | day (4)  | day (5)  | day (6)  | day (7)   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度： 125mL/hにて<br>【臨時】ミンジユピ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴【化療】<br>全量： 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL                 | 【冷所保存】 | +00:00   |          |          |          |          |          |           |
| Rp 02      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>開始量： 100mL/h<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」<br>生理食塩液 500mL       | 点滴【化療】<br>1時間後、200mL/hへUP<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL |        | +02:00   |          |          |          |          |          |           |
| Rp 03      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>Day 1-21<br>レブラミドカプセル 5mg                              | ※化学療法内服<br>20 mg/Body                                        |        | 00:00    |          |          |          |          |          |           |
|            |                                                                           |                                                              |        |          |          |          |          |          |          | → 21 日間内服 |
| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                               | 1 回投与量（補正単位）                                                 | 速度指示   | day (8)  | day (9)  | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14)  |
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度： 125mL/hにて<br>【臨時】ミンジユピ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL   | 点滴【化療】<br>全量： 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL                 | 【冷所保存】 | +00:00   |          |          |          |          |          |           |
| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                               | 1 回投与量（補正単位）                                                 | 速度指示   | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21)  |
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度： 125mL/hにて<br>【臨時】ミンジユピ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴【化療】<br>全量： 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL                 | 【冷所保存】 | +00:00   |          |          |          |          |          |           |
| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                               | 1 回投与量（補正単位）                                                 | 速度指示   | day (22) |          |          |          |          |          |           |
| Rp 01      | ※化学療法（薬剤部ミキシング）<br>速度： 125mL/hにて<br>【臨時】ミンジユピ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴【化療】<br>全量： 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL                 | 【冷所保存】 | +00:00   |          |          |          |          |          |           |

※体重 42kg 未満の場合、生理食塩液 全量 100mL、速度 50mL/h で投与

<4～5 コース目>

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                 | 1 回投与量 (補正単位)                                                | 速度指示   | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>速度: 125mL/hにて<br>[臨時] ミンジュビ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴[化療]<br>全量: 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL                 | 【冷所保存】 | +00:00  |         |         |         |         |         |         |
| 注射         |                                                                             |                                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 02      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>開始量: 100mL/h<br>リツキシマブBS点滴静注「KHK」<br>生理食塩液 500mL        | 点滴[化療]<br>1時間後、200mL/hへUP<br>375 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL |        | +02:00  |         |         |         |         |         |         |
| Rp 03      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>Day 1-21<br>レブラミドカプセル 5mg                               | ※化学療法内服<br>20 mg/Body                                        |        | 00:00   |         |         |         |         |         |         |

21 日間内服

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                 | 1 回投与量 (補正単位)                                | 速度指示   | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>速度: 125mL/hにて<br>[臨時] ミンジュビ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴[化療]<br>全量: 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL | 【冷所保存】 | +00:00   |          |          |          |          |          |          |

※体重 42kg 未満の場合、生理食塩液 全量 100mL、速度 50mL/h で投与

<6～12 コース目>

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                 | 1 回投与量 (補正単位)                                | 速度指示   | day (1) | day (2) | day (3) | day (4) | day (5) | day (6) | day (7) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rp 01      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>速度: 125mL/hにて<br>[臨時] ミンジュビ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴[化療]<br>全量: 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL | 【冷所保存】 | +00:00  |         |         |         |         |         |         |
| 注射         |                                                                             |                                              |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Rp 02      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>Day 1-21<br>レブラミドカプセル 5mg                               | ※化学療法内服<br>20 mg/Body                        |        | 00:00   |         |         |         |         |         |         |

21 日間内服

| RpNo<br>注射 | 薬剤名/手技/コメント                                                                 | 1 回投与量 (補正単位)                                | 速度指示   | day (15) | day (16) | day (17) | day (18) | day (19) | day (20) | day (21) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rp 01      | ※化学療法 (薬剤部ミキシング)<br>速度: 125mL/hにて<br>[臨時] ミンジュビ点滴静注用 200mg<br>生理食塩液 250mL ※ | 点滴[化療]<br>全量: 250mLとして<br>12 mg/kg<br>250 mL | 【冷所保存】 | +00:00   |          |          |          |          |          |          |

※体重 42kg 未満の場合、生理食塩液 全量 100mL、速度 50mL/h で投与

【備考】

- ・タファシタマブの infusion reaction 軽減のため、1 コース目はタファシタマブ投与の 60 分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤を投与(2 コース目以降は任意)。
- ・腎機能に応じてレナリドミドの投与量調整が必要。

CCr≧60mL/min : 20mg/day

30≦CCr<60mL/min : 10mg/day(2 サイクル終了後忍容可能なら 15mg/day まで増量可)

- ・タファシタマブ、リツキシマブによる B 型肝炎ウイルスの再活性化に注意。