

レジメン名： Talquetamab 療法

【適応癌腫】 多発性骨髄腫

【1 コースの期間】 14 日

【最大コース数】 -

【催吐性リスク】 軽度

<漸増期>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 【用時】タービー皮下注 3mg/1.5mL	皮下注[化療] 0.01 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 【用時】タービー皮下注 3mg/1.5mL	皮下注[化療] 0.06 mg/kg	【冷所保存】				+00:00			
注射										
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前に内服 デカドロン錠	※化学療法内服 16 mg/Body		00:00			00:00			
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前に内服 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		00:00			00:00			

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)			
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 【用時】タービー皮下注 40mg/1.0mL	皮下注[化療] 0.4 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 【用時】タービー皮下注 40mg/1.0mL	皮下注[化療] 0.8 mg/kg	【冷所保存】				+00:00			
注射										
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前に内服 デカドロン錠	※化学療法内服 16 mg/Body		00:00			00:00			
Rp 06	※化学療法（薬剤部ミキシング） 治療開始1-3時間前に内服 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		00:00			00:00			

<継続投与期>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 【用時】タービー皮下注 40mg/1.0mL	皮下注[化療] 0.8 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						

【備考】

- ・ 漸増期(初回の治療用量を含む)の各投与後 48 時間は必ず入院管理。
- ・ CRS 軽減のため、トアルクエタマブの漸増期投与の 1～3 時間前に、副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与。CRS 回復後に投与する際も同様。
- ・ ICANS が疑われる症状(失語症、意識レベルの変化、認知機能の障害、筋力低下等)に注意。
- ・ 特徴的な副作用として味覚不全、皮膚障害、爪障害等があげられる。