

レジメン名： **Teclistamab 療法**

- 【適応癌腫】 多発性骨髄腫
- 【1 コースの期間】 (漸増期) 1 日目、4 日目、8 日目に投与
- (継続投与期) 2～24 週目：1 週間に 1 回投与、25 週目以降：2 週間に 1 回投与
- 【最大コース数】 -
- 【催吐性リスク】 最小度

< 漸増期 >

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) [用時] テクベイリ皮下注 30mg/3mL	皮下注 [化療] 0.06 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						
注射										
Rp 02	※化学療法 (薬剤部ミキシング) [用時] テクベイリ皮下注 30mg/3mL	皮下注 [化療] 0.3 mg/kg	【冷所保存】				+00:00			
注射										
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始 1 ～ 2 時間前に投与 デカドロン錠	※化学療法内服 16 mg/Body		00:00			00:00			
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始 6 0 分前に投与 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		00:00			00:00			

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)						
注射										
Rp 03	※化学療法 (薬剤部ミキシング) [用時] テクベイリ皮下注 153mg/1.7mL	皮下注 [化療] 1.5 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						
Rp 04	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始 1 ～ 2 時間前に投与 デカドロン錠	※化学療法内服 16 mg/Body		00:00						
Rp 05	※化学療法 (薬剤部ミキシング) 治療開始 6 0 分前に投与 レスタミンコーワ錠 10mg カロナール錠 200mg	※化学療法内服 5 錠 4 錠		00:00						

< 継続投与期 >

2～24 週目：1 週間間隔で投与

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)						
注射										
Rp 01	※化学療法 (薬剤部ミキシング) [用時] テクベイリ皮下注 153mg/1.7mL	皮下注 [化療] 1.5 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						

25 週目以降：2 週間間隔で投与

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)						
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 皮下注[化療] 【用時】テクベイリ皮下注 153mg/1.7mL	1.5 mg/kg	【冷所保存】	+00:00						

【備考】

- ・ 漸増期の投与後 48 時間は必ず入院管理。
- ・ CRS 軽減のため、漸増期投与(漸増用量 1、漸増用量 2、治療用量の初回投与)の 1～3 時間前に、副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与。CRS 回復後に投与する場合も同様。
- ・ ICANS が疑われる症状(失語症、意識レベルの変化、認知機能の障害、筋力低下等)に注意。
- ・ ST 合剤、アシクロビルの予防投与を推奨。
- ・ CMV の再活性化に注意。
- ・ 低 γ グロブリン血症に注意。定期的なモニタリングを推奨。