

レジメン名： VenObi 療法

- 【適応癌腫】 慢性リンパ性白血病
- 【1 コースの期間】 28 日
- 【最大コース数】 12 コース ※7～12 コース目はベネクレクタの投与のみ
- 【催吐性リスク】 軽度

<1 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分かけて デカドロン注射液 生理食塩液 50mL	点滴静注（速度入力なし） 16.5 mg/Body 50 mL		+00:00	+00:00					
注射										
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） 速度： 25mL/hにて [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 100mL	点滴[化療] 全量： 100mLとして 100 mg/Body 100 mL		+01:00						
注射										
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30分ごとに13mL/hずつup MAX： 110mL/hまで [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 開始量： 13mL/h 全量： 250mLとして 900 mg/Body 250 mL			+01:00					
注射										
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00	00:00					

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30分ごとに25mL/hずつup MAX： 100mL/hまで [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 開始量： 25mL/h 全量： 250mLとして 1000 mg/Body 250 mL		+00:00						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
Rp 04	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30分ごとに25mL/hずつup MAX： 100mL/hまで [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 開始量： 25mL/h 全量： 250mLとして 1000 mg/Body 250 mL		+00:00						
Rp 05	※化学療法（薬剤部ミキシング） ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						

<3～6 コース目>

RpNo 注射	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（補正単位）	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	※化学療法（薬剤部ミキシング） 30分ごとに25mL/hずつup MAX： 100mL/hまで [用時]ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL 生理食塩液 250mL	点滴[化療] 開始量： 25mL/h 全量： 250mLとして 1000 mg/Body 250 mL		+00:00						
Rp 02	※化学療法（薬剤部ミキシング） ガザイバ開始30分前に内服 カロナール錠 300mg レスタミンコーワ錠 10mg	※化学療法内服 2 錠 5 錠		00:00						
Rp 03	※化学療法（薬剤部ミキシング） day1-28 ベネクレクタ錠100mg	※化学療法内服 1日1回 400 mg/Body		00:00						

28 日目まで

<7～12 コース目>

ベネクレクタ錠 400mg/body day1～28 まで投与

【備考】

- ・オビスツズマブの Infusion reaction に注意。
- ・ベネトクラクスは CYP3A 阻害剤と併用する場合は減量（中程度の阻害剤：半量以下、強い阻害剤：50mg に減量）